

# 水質汚濁に係る農薬登録保留基準として 環境大臣の定める基準の設定に関する資料

## 資料目次

	農薬名	基準設定	ページ
1	アシベンゾラルS-メチル	新規	1

平成30年5月15日

環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室

# 評 価 農 薬 基 準 値 一 覧


農薬名	基準値(mg/L)
1 アシベンゾラルS-メチル	0.20

## 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料

## アシベンゾラル S-メチル

## I. 評価対象農薬の概要

## 1. 物質概要

化学名 (IUPAC)	S-メチル=ベンゾ [1, 2, 3] チアジアゾール-7-カルボチオアート				
分子式	C <sub>8</sub> H <sub>6</sub> N <sub>2</sub> OS <sub>2</sub>	分子量	210.3	CAS NO.	135158-54-2
構造式					

## 2. 作用機構等

アシベンゾラル S-メチルは、殺菌剤であり、その作用機構は植物の全身獲得抵抗性を誘導することにより病原菌の防除を可能にすると考えられている。

本邦では未登録である。

製剤は水和剤が、適用農作物等は野菜として登録申請されている。

## 3. 各種物性等

外観・臭気	白色粉末固体、無臭	土壌吸着係数	$K_{F^{ads}_{OC}} = 490 - 3,300$ (外国土壌) $K_{F^{ads}_{OC}} = 720$ (日本土壌)
融点	132.9°C	オクタノール /水分配係数	$\log Pow = 3.1$ (25°C)
沸点	約 267°C	生物濃縮性	—
蒸気圧	$2.2 \times 10^{-4}$ Pa (20°C) $4.6 \times 10^{-4}$ Pa (25°C)	密度	$1.5 \text{ g/cm}^3$ (22°C)
加水分解性	半減期 57.5 日 (20°C、pH1) 52.3 日 (22°C、pH1) 3.8 年 (20°C、pH5) 3.0 年 (22°C、pH5) 23.1 週 (20°C、pH7) 16.7 週 (22°C、pH7) 19.4 時間 (20°C、pH9) 15.2 時間 (22°C、pH9) < 5 分 (25°C、pH13)	水溶解度	7.7 mg/L (25°C)
水中光分解性	半減期 0.86 - 0.92 時間 (東京春季換算 2.97 - 3.18 時間) (滅菌緩衝液、pH5.12、25°C、26.86 W/m <sup>2</sup> 、300 - 400 nm) 0.0078 日 (東京春季換算 1.21 時間) (滅菌自然水、pH6.4、25°C、50 W/m <sup>2</sup> 、300 - 400 nm)		

## II. 安全性評価

一日摂取許容量 (ADI)	0.077 mg/kg 体重/日
<p>食品安全委員会は、平成 30 年 2 月 13 日付けで、アシベンゾラル-S-メチルの ADI を 0.077 mg/kg 体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知した。</p> <p>なお、この値は各試験で得られた無毒性量のうち最小値 7.77 mg/kg 体重/日を安全係数 100 で除して設定された。</p>	

### Ⅲ. 水質汚濁予測濃度（水濁 PEC）

#### 1. 製剤の種類及び適用農作物等

申請者より提出された申請資料によれば、本農薬は製剤として水和剤があり、適用農作物等は野菜として登録申請されている。

#### 2. 水濁 PEC の算出

##### (1) 非水田使用時の水濁 PEC（第1段階）

非水田使用時において、PEC が最も高くなる使用方法（下表左欄）について、第1段階の PEC を算出する。算出に当たっては、農薬取締法テストガイドラインに準拠して下表右欄のパラメーターを用いた。

PEC 算出に関する使用方法		各パラメーターの値	
適用農作物等	野菜	$I$ : 単回・単位面積当たりの有効成分 量（有効成分 g /ha） （左欄の最大使用量に、有効成分濃度 を乗じた上で、単位を調整した値 （製剤の密度は 1 g/mL として算出））	33.3
剤 型	50%顆粒水和剤		
当該剤の単 回・単位面積当 たり最大使用 量 ※算出値	6.67 mL/10a* （セル成型育苗トレイ 1箱又はペーパーポッ ト1冊当たり 5,000 倍 希釈した薬液を 0.5L 使用）	$N_{app}$ : 総使用回数（回）	1
		$D_{river}$ : 河川ドリフト率（%）	0
		$Z_{river}$ : 河川ドリフト面積（ha）	0.11
地上防除/航空 防除の別	地上防除	$R_u$ : 畑地からの農薬流出率（%）	0.02
使用方法	灌注	$A_p$ : 農薬使用面積（ha）	37.5
総使用回数	1回	$F_u$ : 施用方法による農薬流出補正係数	0.1

\*キャベツの植栽密度 4,800 本/10a、72 穴セルトレイ（66.6 セルトレイ/10a）を用いて算出

##### (2) 水濁 PEC 算出結果

使用場面	水濁 PEC (mg/L)
水田使用時	適用なし
非水田使用時(第1段階)	0.000000073143...
うち地表流出寄与分	0.000000073143...
うち河川ドリフト寄与分	0
合 計 <sup>1)</sup>	0.0000000731... ≒ $7.3 \times 10^{-8}$ (mg/L)

<sup>1)</sup> 水濁 PEC の値は有効数字 2 桁とし、3 桁目を四捨五入して算出した。

## IV. 総合評価

### 1. 水質汚濁に係る登録保留基準値

登録保留基準値	<b>0.20 mg/L</b>
以下の算出式により登録保留基準値を算出した。 <sup>1)</sup>	
$0.077 \text{ (mg/kg 体重/日)} \times 53.3 \text{ (kg)} \times 0.1 \text{ / } 2 \text{ (L/人/日)} = 0.205\dots \text{ (mg/L)}$	
ADI	体重 10%配分 飲料水摂取量

<sup>1)</sup> 登録保留基準値は、体重を 53.3kg、飲用水を 1 日 2L、有効数字は 2 桁（ADI の有効数字桁数）とし、3 桁目を切り捨てて算出した。

<参考> 水質に関する基準値等

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 <sup>1)</sup>	なし
水質要監視項目 <sup>2)</sup>	なし
水質管理目標設定項目 <sup>3)</sup>	なし
ゴルフ場指導指針 <sup>4)</sup>	なし
WHO 飲料水水質ガイドライン <sup>5)</sup>	なし

<sup>1)</sup> 平成 17 年 8 月 3 日改正前の「農薬取締法第 3 条第 1 項第 4 号から第 7 号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件」（昭和 46 年 3 月 2 日農林省告示 346 号）第 4 号に基づき設定された基準値。

<sup>2)</sup> 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質に係る指針値。

<sup>3)</sup> 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る目標値。

<sup>4)</sup> 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針の制定について」（平成 29 年 3 月 9 日付け環水大土第 1703091 号環境省水・大気環境局長通知）において設定された水濁指針値。

<sup>5)</sup> Guidelines for drinking-water quality, fourth edition

### 2. リスク評価

水濁 PEC は  $7.3 \times 10^{-8}$  mg/L であり、登録保留基準値 0.20 mg/L を超えないことを確認した。

(参考) 食品経由の農薬理論最大一日摂取量と対 ADI 比

農薬理論最大一日摂取量(mg/人/日)	対 ADI 比 (%)
0.158	3.7

出典:平成 28 年 3 月 1 日開催の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会資料